



INSTITUTS  
GUIRADO

# Caso Clínico-Radiológico de Marzo 2017

Tomografía Computarizada Haz Cónico

Jorge Salmerón

- Paciente de 73 años de edad
- Antecedentes de OMCS de varios años de evolución del oído derecho.
- Perforación timpánica
- Hipoacusia de transmisión severa
- Estudio realizado con CBCT Newtom 5G XL, Baja Dosis 70 DLP mGy cm.



INSTITUTS  
**GUIRADO**



# Cortes Coronales





INSTITUTS  
**GUIRADO**


# Cortes Coronales






INSTITUTS  
**GUIRADO**

# Cortes Axiales






# Cortes Axiales





INSTITUTS  
**GUIRADO**

# Cortes Axiales




- Desarrollo ebúrneo de la mastoides.
- Contenido de alta densidad en la caja timpánica.
- Osificación del tendón del músculo del martillo.
- Lisis de la rama larga del yunque.
- Fibrosis periosicular.



INSTITUTS  
GUIRADO



Flecha roja lisis rama larga del yunque



Flecha roja osificación del tendón del músculo del martillo.  
Fibrosis periosicular del mango del martillo



Contenido de alta densidad en la caja timpánica



INSTITUTS  
GUIRADO



Fibrosis periosicular con unas cruras aumentadas de volumen  
Especialmente la crura más anterior.



INSTITUTS  
GUIRADO

# Diagnóstico

Tofos de Timpanoesclerosis en la caja timpánica con fibrosis periosicular y lisis de la rama larga del yunque.